

Hydal[®] retard Kapseln

(Hydromorphon-Hydrochlorid)

2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg, 24 mg Kapseln zu 10 und 30 Stück

Der 12 Stunden wirksame Standard in der Tumor-Schmerztherapie

Die Vorteile für Ihre Patienten:

- **schneller Wirkeintritt für rasche Schmerzlinderung**
- **schon niedrige Dosen bewirken Schmerzfreiheit (4–8 mg Tagesdosis)**
- **7,5 mal stärkere Wirkung als Morphin**
- **keine Dosisbegrenzung, da kein Ceiling-Effekt**
- **keine analgetisch aktiven Metaboliten**
- **besonders geeignet für geriatrische Patienten und Patienten mit eingeschränkter Organfunktion**
- **für Patienten mit Schluckschwierigkeiten können die Kapseln geöffnet und deren Inhalt über kalte Weichspeisen (z. B. Joghurt) gestreut werden (Pellets nicht zerkauen)**

Zusammensetzung:

Arzneilich wirksame Bestandteile nach Art und Menge:

1 Kapsel enthält 2 mg (4 mg, 8 mg, 16 mg, 24 mg) Hydromorphon-Hydrochlorid.

Anwendungsgebiete:

Linderung von schweren und schwersten Schmerzen.

Gegenanzeigen:

Atemdepression, Schwangerschaft, Koma, akutes Abdomen, schwere Leberfunktionsstörung, bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Hydromorphon, Begleittherapie mit Monoaminoxidasehemmern oder innerhalb zwei Wochen nach deren Absetzen. Bei Patienten mit erhöhtem Hirndruck oder Kopfverletzungen, wie auch bei Patienten mit konvulsiven Erkrankungen oder akutem Alkoholismus sollte die Gabe von Hydral[®] retard Kapseln vermieden werden.

Eine präoperative Verabreichung von Hydral[®] retard Kapseln wird nicht empfohlen und ist keine genehmigte Indikation.

Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, und zu den Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen „Austria-Codex Fachinformation“ zu entnehmen.